

BØRNELÆGE ALLERGIKLINIK

Birgitte Frederiksen Videbæk
Parkvej 46D, 4700 Næstved.
Tlf. 55 73 10 66 man-tor 8-12
E-mail: praksis@boernelaege-naestved.dk
Hjemmeside: www.boernelaege-naestved.dk



BØRNELÆGE ALLERGIKLINIK

Birgitte Frederiksen Videbæk
Parkvej 46D, 4700 Næstved.
Tlf. 55 73 10 66 man-tor 8-12
E-mail: praksis@boernelaege-naestved.dk
Hjemmeside: www.boernelaege-naestved.dk



Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig på:

Tlf. 55 73 10 66
man-tors 8-12

Der er aftalt tid til øjenprovokation med:



**Information
Om
Øjenprovokation**
(konjunktival provokation)

Hvorfor øjenprovokation?

Øjenprovokation foretages for at måle graden af følsomhed i øjne og næse over for et bestemt allergen (det stof man er overfølsom over for). Undersøgelsens resultat har betydning for diagnose og evt. behandlingstilbud.

Hvordan foregår øjenprovokationen?

Allergen-ekstrakt i forskellige fortyndinger dryppes i øjnene 5 gange med mindst 10 minutters interval.

Der måles lungefunktion før og efter testen og der sættes en positiv og negativ priktest.

Efter drypning kan der komme reaktioner, der svarer til en allergisk betinget irritation som kløe, rødme, hævelse, tåreflåd, nysen, stoppet eller løbende næse svarende til de symptomer, du plejer at få ved kontakt med allergenet.

Hvis undersøgelsen viser et positivt resultat standses undersøgelsen, og der gives anti-allergiske øjendråber.

Selve undersøgelsen tager ca. 1½ time. Herefter følger evt. behandling og lægesamtale.

Før øjenprovokationen. VIGTIGT!

Følgende medicin må ikke tages op til provokationen:

- ✓ **14 døgn før: Næsespray med steroid** f. eks: Nasonex, Rhinocort, Flixonase, Beconase, Avamys, Dymista
- ✓ **3 døgn før: Antihistamin** f.eks. Alnok, Cetirizin, Xyzal, Aerius, Revitelle, Benadryl
- ✓ **3 døgn før: Øjendråber** f. eks Opatanol, Livostin, Antistina Privin, Lomudal, Tilavist
- ✓ **3 døgn før: Næsespray** f.eks. Iliadin, Otrivin, Livostin, Lomudal

Ovenstående medicin må benyttes igen, når undersøgelsen er helt afsluttet.

Hvis du har øjeninfektion, er meget forkølet eller påvirket af allergi skal øjenprovokationen udsættes, til du er rask igen.

Du kan ikke bære kontaktlinser i forbindelse med undersøgelsen.