

## BØRNELÆGE ALLERGIKLINIK

Birgitte Frederiksen Videbæk  
Parkvej 46D, 4700 Næstved.  
Tlf. 55 73 10 66 man-tors 8-12  
Email: [praksis@boernelaege-naestved.dk](mailto:praksis@boernelaege-naestved.dk)  
Hjemmeside: [www.boernelaege-naestved.dk](http://www.boernelaege-naestved.dk)



## BØRNELÆGE ALLERGIKLINIK

Birgitte Frederiksen Videbæk  
Parkvej 46D, 4700 Næstved.  
Tlf. 55 73 10 66 man-tors 8-12  
Email: [praksis@boernelaege-naestved.dk](mailto:praksis@boernelaege-naestved.dk)  
Hjemmeside: [www.boernelaege-naestved.dk](http://www.boernelaege-naestved.dk)



**Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig på:**

**Tlf. 55 73 10 66**  
man-tors 8-12

**Der er aftalt tid til:**

---

## Information Om Penicillin/medicin- provokation



### **Hvorfor penicillin/medicin-provokation?**

Provokationen foretages for at finde ud af, om du kan tåle et bestemt medikament.

### **Forberedelse til undersøgelsen (kun for penicillin-allergi).**

Inden selve provokationen er der taget en blodprøve, en RAST test for penicillin.

Er denne positiv, er man allergisk og behøver ikke yderligere undersøgelser. Er den negativ, **skal** der laves en provokation med penicillin, da en negativ blodprøve ikke udelukker allergi.

### **Før provokationen. VIGTIGT!**

Følgende medicin må ikke tages op til provokationen:

- ✓ **3 døgn før:** Antihistaminer: **det gælder både øjendråber, næsespray og tabletter/mixtur**
- ✓ **mindst 6 timer før:** hurtigvirkende astmamedicin- Buventol/Bricanyl/ Ventoline/ Airomir
- ✓ **mindst 24 timer før:** Bufomix/Symbicort/ Seretide
- ✓ **mindst 24 timer før:** Singulair/montelukast

Tal med lægen hvis du får anden medicin.

Du skal være rask og må ikke have udslæt den dag, undersøgelsen foretages.

### **Selve provokationen.**

Du vil blive undersøgt af sygeplejersken: lungefunktion, puls og blodtryk måles, og huden efterses for udslæt/eksem.

Herefter får du en lille dosis flydende penicillin/medicin.

Hvis dette tåles, øges mængden med 30 minutters mellemrum, til du har indtaget en normal dosis penicillin/medicin.

Herefter observeres du i yderligere 2 timer.

Hele testen varer 4-6 timer, og det er derfor en god idé at medbringe lidt underholdning (læsestof – legetøj o.l.)

Du må ikke forlade klinikken under testen.

Du må spise din sædvanlige morgenmad og medbring gerne en madpakke til efter provokationen.

Kommer der reaktioner på provokationen, vil vi afbryde testen og behandle symptomerne.

### **Efter provokationen**

Når testen er slut, taler du med lægen, får information om evt. senreaktioner, og får en kopi af provokations-journalen.

Du skal i de næste dage være opmærksom på følgende symptomer og kontakte os ved:

- Hududslæt, i op til 3 døgn efter provokationen. Tag foto hvis muligt. Ved kløende udslæt kan der tages en antihistamin.
- Feberreaktioner (med eller uden hududslæt) i op til 10 døgn efter provokationen.

Symptomer fra mave/tarm kanalen i form af opkastninger og/eller diarre har sjældent sammenhæng med penicillinallergi, men er oftere en bivirkning.

Du vil blive kontaktet dagen efter for at høre, om der har været senreaktioner. Din læge får besked om resultatet.

### **Har du reaktioner/symptomer uden for vores åbningstid og er i tvivl – så kontakt vagtlæge/ skadestue – og medbring kopi af provokations-journalen.**

Hvis der er tvivl om resultatet efter provokationen, kan det være nødvendigt at gentage den.