

BØRNELÆGE ALLERGIKLINIK

Birgitte Frederiksen Videbæk
Parkvej 46D, 4700 Næstved.
Tlf. 55 73 10 66 man-tors 8-12
Email: Via patientportalen på
www.børnelæge-næstved.dk



BØRNELÆGE ALLERGIKLINIK

Birgitte Frederiksen Videbæk
Parkvej 46D, 4700 Næstved.
Tlf. 55 73 10 66 man-tors 8-12
Email: Via Patientportalen på
www.børnelæge-næstved.dk



Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig på:

Tlf. 55 73 10 66
man-tors 8-12

Der er aftalt tid til:



**Information
om
Mannitol test**

Hvad er Mannitol?

Mannitol er et sukkermolekyle, der benyttes til at måle følsomheden i luftvejene. Mannitol har, når det indåndes, en let udtørrende effekt på slimhinderne i luftvejene. Denne udtørring kan sidestilles med den udtørring, der foregår ved anstrengelse. Hos nogle personer kan dette fremkalde en let sammentrækning af de små luftrør, hvilket er tegn på en øget følsomhed.

Hvorfor udføres en Mannitol test?

Ved en række sygdomme (specielt astma) kan følsomhed i luftvejene være øget. Mannitol testen bruges til at bestemme om følsomheden i luftvejene er højere end normalt.

Hvordan foretages en Mannitol test?

Du indånder Mannitol i stigende mængde. Imellem hver indånding får du målt din lungekapacitet Du får en næseklemme på under selve indåndingen af Mannitol.

Udløser undersøgelsen et fald i lungekapaciteten, afslutter vi undersøgelsen og du vil straks få astmamedicin. Lungekapaciteten vil hurtigt blive normal igen.

Hvor længe varer en Mannitol test?

Ca. 45 minutter.

Er der bivirkninger?

Der kan komme tørhed og irritation i svælget samt hoste. Generne forsvinder kort efter testens ophør.

Hvornår kan Mannitol testen ikke foretages?

Er du forkølet, har lungebetændelse eller har meget nedsat lungekapacitet kan testen ikke foretages.

Medicin før undersøgelsen?

En del medicin påvirker resultatet og du skal derfor holde pause med følgende, med mindre du har fået besked om andet:

- ✓ **8 timer før:** Airomir, Buventol, Bricanyl, Ventoline
- ✓ **12 timer før:** Aerobec, Flixotide, Pulmicort, Spirocort
- ✓ **24 timer før:** Bufomix, Symbicort, Seretide
- ✓ **3 døgn før:** Antihistaminer (allergitabletter)
- ✓ **4 døgn før:** Singulair/montelukast

Andre forhold før Mannitol testen

Undgå Koffein (findes i kaffe, the, cola og chokolade) samme dag, Lad være med at ryge mindst 6 timer før testen
Undgå hård fysisk aktivitet samme dag.

Efter Mannitol testen

Du kan fortsætte med din sædvanlige medicin umiddelbart efter Mannitol testen.